

2025年11月 薬事審議会 結果

南古谷病院 薬剤科

1. 新規採用

1) ジンタス錠 50mg (232.9 円/錠)

採用区分	院内・院外
効能効果	低亜鉛血症（ウィルソン病は適応外）
用法用量	成人及び体重 30kg 以上の小児では、亜鉛として、1 回 50～100mg を開始用量とし 1 日 1 回食後に経口投与する。なお、血清亜鉛濃度や患者の状態により適宜増減するが、1 日 1 回 150mg を超えないこと。

2) グルベス配合 OD 錠 (25.8 円/錠)

採用区分	院内（院外採用あり）
効能効果	2 型糖尿病 ただし、ミチグリニドカルシウム水和物及びボグリボースの併用による治療が適切と判断される場合に限る。
用法用量	通常、成人には 1 回 1 錠（ミチグリニドカルシウム水和物／ボグリボースとして 10 mg／0.2 mg）を 1 日 3 回毎食直前に経口投与する。

3) タモキシフェン錠 10mg 「DSEP」 (15.5 円/錠)

採用区分	院内・院外
効能効果	乳癌
用法用量	成人にはタモキシフェンとして 1 日 20mg を 1～2 回に分割経口投与する。 なお、症状により適宜増量できるが、1 日最高量はタモキシフェンとして 40mg までとする。
備考	院内は当該患者入院中のみ。

4) プラバスタチン Na 錠 10mg 「サワイ」 (14.1 円/錠)

採用区分	院内・院外
効能効果	高脂血症 家族性高コレステロール血症
用法用量	成人にはプラバスタチンナトリウムとして、1 日 10mg を 1 回または 2 回に分け経口投与する。なお、年齢・症状により適宜増減するが、重症の場合は 1 日 20mg まで増量できる。

2. 採用削除および変更

【採用削除】

《院外》

1	製品名	ビクトーザ皮下注 18mg (8,434 円/キット)
	薬効	ヒト GLP-1 アナログ注射液
	内容	2026 年後半出荷終了（販売終了：弊社から卸各社へ）見込み
	備考	代替候補：オゼンピック皮下注 2mg リベルサス錠 (3mg, 7mg, 14mg)

【採用変更】

＜院内・院外＞

1.	製品名	メイラックス錠 1mg (10.4 円/錠)
	薬効	超長時間型抗不安薬 神経症における不安・緊張・抑うつ・睡眠障害 心身症（胃・十二指腸潰瘍、慢性胃炎、過敏性腸症候群、自律神経失調症）に おける不安・緊張・抑うつ・睡眠障害
	内容	後発品へ変更 ロフラゼプ酸エチル錠 1mg 「トーワ」 (6.1 円)
	備考	院外処方箋の記載は一般名処方：【般】ロフラゼプ酸エチル錠 1mg

2.	製品名	ワイパックス錠 0.5mg (6.1 円/錠)
	薬効	中間型抗不安薬 神経症における不安・緊張・抑うつ、心身症（自律神経失調症、心臓神経症） における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ
	内容	後発品へ変更 ロラゼパム錠 0.5mg 「サワイ」 (5.3 円)
	備考	院外処方箋の記載は一般名処方：【般】ロラゼパム錠 0.5mg

3.	製品名	リズミック錠 10mg (11.7 円/錠)
	薬効	本態性低血圧、起立性低血圧、透析施行時の血圧低下の改善
	内容	後発品へ変更 アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「トーワ」 (6.4 円)
	備考	院外処方箋の記載は一般名処方：【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg

4.	製品名	トリクロルメチアジド錠 1mg 「トーワ」 (6.4 円/錠)
	薬効	チアジド系利尿薬
	内容	規格変更 トリクロルメチアジド 2mg 「トーワ」 (6.4 円/錠)

以上