

2026年3月 薬事審議会 結果

南古谷病院 薬剤科

1. 新規採用

- 1) ケレンディア錠 10mg
- 2) ケレンディア錠 20mg

申請理由	<ul style="list-style-type: none"> ●FIDELIO-DKD 試験（腎アウトカム）：腎不全の進行（eGFRの持続的低下、末期腎不全、腎死）のリスクを18%有意に低下させた。 ●FIGARO-DKD 試験（心血管アウトカム）：心血管イベント（心血管死、非致死性心筋梗塞、非致死性脳卒中、心不全入院）の複合リスクを13%有意に低下させた。
採用区分	院外のみ
効能効果	<ul style="list-style-type: none"> ●2型糖尿病を合併する慢性腎臓病ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。 ●慢性心不全ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。
備考	<ul style="list-style-type: none"> ●10mg錠と20mg錠の生物学的同等性は示されていないため、20mg又は40mgを投与する際には10mg錠を使用しないこと。 ●高カリウム血症が現れることがあるため、血清カリウム値が一定以下の患者に投与を開始し、4週間後に血清カリウム及びeGFRを測定し、その後も定期的に測定すること <2型糖尿病を合併する慢性腎不全：4.8mEq/L以下> <慢性心不全：5.0mEq/L以下>

3) プレベナー20®水性懸濁注

採用区分	院内（注射）
効能効果	<ul style="list-style-type: none"> ○高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者肺炎球菌（血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、8、9V、10A、11A、12F、14、15B、18C、19A、19F、22F、23F及び33F）による感染症の予防 ○小児肺炎球菌（省略）
備考	<p>※過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックス®)を接種したことのある方は、市の助成を受けたか否かに関わらず、定期予防接種の対象となりません。</p> <p>自己負担額は調整中（川越市）</p> <p><u>任意接種費用：11,000円（税込）</u></p>

2. 採用削変更

【採用変更】

1.	製品名	エフィエント錠 3.75mg	
	薬効	抗血小板剤	
	内容	院内採用は見送り（脳の適応がないため）	
	備考	院外処方是一般名処方：【般】 プラスグレル錠 3.75mg	
		先発	後発
	適応症	経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される下記の虚血性心疾患 急性冠症候群（不安定狭心症、非 ST 上昇心筋梗塞、ST 上昇心筋梗塞） 安定狭心症、陳旧性心筋梗塞"	
		虚血性脳血管障害（大血管アテローム硬化 又は小血管の閉塞に伴う）後の再発抑制 （脳梗塞発症リスクが高い場合に限る）	

2.	製品名	フェリセルツ散 20%
	薬効	MRI 用経口消化管造影剤
	内容	「ボースデル内用液 10 250mL」へ変更。

3.	製品名	ロペミン小児用細粒 0.05%
	薬効	止痢薬
	内容	院外のみ採用中 → 「ロペミン細粒 0.1%」へ変更
	備考	小児用細粒、使用実績ないため。